



8资料说明：破伤风、白喉、百日咳疫苗(Tdap)

什么是破伤风（牙关紧闭症）？

破伤风是一种严重的疾病，当带有破伤风细菌的污垢进入皮肤的伤口，可能会引发感染。破伤风细菌随处可见，通常存在于土壤、灰尘和粪便中。它不会在人与人之间传播。破伤风导致颈部、手臂、腿和胃部肌肉痉挛。它还可能引起疼痛的抽搐，这可能严重到足以导致骨折。即使是早期治疗，每10名破伤风患者中会有2名死于此病。

什么是白喉？

白喉是一种严重的鼻、喉和皮肤疾病。它会引起喉咙痛、发烧和寒战。它还可能导致更严重的并发症，如呼吸问题、心力衰竭和神经损伤。大约每10人中就有1人死于白喉病。它通常通过咳嗽和打喷嚏传递给别人。

什么是百日咳(哮喘)？

百日咳是一种常见病，可导致长期的咳嗽疾病。百日咳在婴儿中尤其严重。这种咳嗽会导致短期内呕吐或停止呼吸。咳嗽会持续数周，使进食、喝水甚至呼吸变得困难。百日咳可引起严重的肺炎等并发症。百日咳还会引起脑损伤和癫痫发作，尤其是在婴儿中。百日咳很容易通过咳嗽或打喷嚏从感染者身上传播到他人身上。成人被认为是婴幼儿百日咳感染的主要来源。受感染的成年人和青少年可以将这种疾病传染给尚未得到完全保护的婴儿，这些婴儿发生百日咳并发症的风险更大。

谁有资格接种公费疫苗？

- 14至16岁的青少年需要接种Tdap疫苗（4至6岁接种后的10年）
- 所有成年人（≥18岁）都有资格接种一剂Tdap（通常在青少年接种Tdap的10年后接种）

所有孕妇在每次妊娠中都有资格接种百日咳，无论既往Tdap免疫接种史。

谁不应该接种Tdap疫苗呢？

以下人士不应该接种该疫苗：

- 对前一剂白喉、破伤风或百日咳的疫苗有过敏反应者。
- 对该疫苗成分和/或要素都有过敏反应者。
- 在接种含百日咳疫苗后7天内患有脑病者。
- 在接种破伤风疫苗后六周内就出现Guillain-Barré syndrome (GBS)的患者。
- 患有高烧或比感冒更严重的严重感染者（应推迟接种疫苗）。

如果您由于疾病或治疗，严重影响到免疫系统，或在过去10年内因破伤风疫苗引起注射部位的严重反应，请向您的医疗保健提供者咨询是否适合接种该疫苗。

Tdap 疫苗安全吗？

安全，Tdap疫苗是安全的。该疫苗的副作用很轻微，常见副作用包括注射部位的疼痛和/或发红。疲劳、头痛、发烧、全身疼痛和关节疼痛或肿胀也可能发生。这些症状通常在接种疫苗后仅持续一到两天。